

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю Агро-Кеми Кфт. (Венгрия)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Кинмикс, КЭ (50 г/л бета-циперметрин)

(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:

номер государственной регистрации

262-01-9609-0

дата государственной регистрации

1 октября 2025 г.

на срок по 30 сентября 2028 г.

и допущенный к обороту

на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный организм	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработок) ¹	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ
1	2	3	4	5	6
0,15-0,2 л/га	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20 (2)	3/3
0,2-0,3 л/га	Капуста кочанная	Капустная моль, капустная совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20 (2)	3/3
0,4-0,6 л/га	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации до или после цветения. Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20 (2)	3/3

0,32-0,48 л/га	Слива, черешня, вишня	Тли	Опрыскивание в период вегетации до или после цветения. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	30 (2)	3/3
-------------------	-----------------------	-----	--	--------	-----

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработок) ¹	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ
1	2	3	4	5	6
1,5-2,0 мл/100 м2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 4 л/ 100 м2	20 (2)	3/-
2,0-3,0 мл/100 м2	Капуста	Капустная моль, капустная совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 4 л/ 100 м2	20 (2)	3/-
4,0 мл/10 л воды	Слива, вишня, черешня	Тли	Опрыскивание в период вегетации до или после цветения. Расход рабочей жидкости - 1-3 л/куст	30 (2)	3/-
1,0-5,0 мл/10 л воды	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации до или после цветения. Расход рабочей жидкости - 4-5 л/куст	20 (2)	3/-

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

¹ Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 01.10.2025

Заместитель директора
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений

(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)

И. А. Широкова

(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**
Сертификат:
2575FF9FA0C657E7498CE64D7A3D53BB
Владелец: Широкова Ирина Алексеевна
Действителен: с 19.03.2025 до 12.06.2026